



§ 2.4 高阶导数

- ❖ 高阶导数的定义
- ❖ 高阶导数求法举例



高阶导数的定义

问题 变速直线运动的加速度.

设 $s = f(t)$, 则瞬时速度为 $v(t) = f'(t)$

\hookrightarrow 加速度 α 是速度 v 对时间 t 的变化率

$$\therefore \alpha(t) = v'(t) = [f'(t)]'.$$

定义 如果函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在点 x 处可导,

即 $(f'(x))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$

存在, 则称 $(f'(x))'$ 为函数 $f(x)$ 在点 x 处的**二阶导数**, 记为 $f''(x), y'', \frac{d^2 y}{dx^2}$ 或 $\frac{d^2 f(x)}{dx^2}$.



高阶导数的定义

类似地，二阶导数的导数称为**三阶导数**，记为

$$f'''(x), y''', \frac{d^3 y}{dx^3}.$$

一般地， $f(x)$ 的 $n - 1$ 阶导数的导数称为 $f(x)$ 的 **n 阶导数**，记为

$$f^{(n)}(x), y^{(n)}, \frac{d^n y}{dx^n} \text{ 或 } \frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

注：二阶和二阶以上的导数统称为**高阶导数**.

相应地， $f(x)$ 称为**零阶导数**； $f'(x)$ 称为**一阶导数**.



计算高阶导数的方法

1. **直接法**: 由高阶导数的定义逐步求高阶导数.

例如, $y = ax + b$, 则有

$$y' = a, y'' = 0, \Lambda, y^{(n)} = 0 (n \geq 3).$$

$y = e^x$, 则有

$$y' = e^x, y'' = e^x, y''' = e^x, \Lambda, y^{(n)} = e^x (n \geq 3).$$

一般地, $y^{(n)} = e^x$

2. **间接法**: 利用已知的高阶导数公式, 通过导数的四则运算, 变量代换等方法, 求出 n 阶导数.



❖ 高阶导数求法举例

例1 设 $y = f(x) = \arctan x$, 求 $f'''(0)$.

解 $y' = \frac{1}{1+x^2},$

$$y'' = \left(\frac{1}{1+x^2} \right)' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2},$$

$$y''' = \left(\frac{-2x}{(1+x^2)^2} \right)' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3},$$

$$f'''(0) = \left. \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3} \right|_{x=0} = -2.$$



例2 设 $y = x^a$ ($a \in R$), 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = ax^{a-1}$,

$$y'' = (ax^{a-1})' = a(a-1)x^{a-2},$$

$$y''' = (a(a-1)x^{a-2})' = a(a-1)(a-2)x^{a-3},$$

$$y^{(n)} = a(a-1)\overset{\text{L}}{\underset{\text{L}}{\cdots}} (a-n+1)x^{a-n} (n \geq 1),$$

若 a 为自然数 n , 则

$$y^{(n)} = (x^n)^{(n)} = n!, \quad y^{(n+1)} = (n!)' = 0.$$

注: 求 n 阶导数时, 求出1-3或4阶后, 不要急于合并, 分析结果的规律性, 写出 n 阶导数(利用数学归纳法).



例3 设 $y = \ln(1 + x)$, 求 $y^{(n)}$.

解

$$y' = \frac{1}{1+x},$$

$$y'' = -\frac{1}{(1+x)^2},$$

$$y''' = \frac{2!}{(1+x)^3},$$

$$y^{(4)} = -\frac{3!}{(1+x)^4},$$

L L

$$y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (n \geq 1, 0! = 1).$$



补例 $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$

$$(e^{ax})' = ae^{ax}, \quad (e^{ax})'' = (ae^{ax})' = a^2 e^{ax}, \Lambda$$

补例 $\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(x+a)^{n+1}}$

$$\left(\frac{1}{x+a}\right)' = -(x+a)^{-2},$$

$$\left(\frac{1}{x+a}\right)'' = [-(x+a)^{-2}]' = (-2)(-1)(x+a)^{-3}, \Lambda$$

补例 $[\ln(x+a)]^{(n)} = (-1)^{(n-1)} \frac{(n-1)!}{(x+a)^n}$

$$[\ln(x+a)]' = \frac{1}{x+a}, \quad [\ln(x+a)]^{(n)} = \left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n-1)},$$



例4 $y = \sin x$, $(y)^{(2006)} = -\sin x$

$$y' = \cos x,$$

$$y'' = -\sin x,$$

$$y''' = -\cos x,$$

$$y^{(4)} = \sin x,$$

$$(\sin x)^{(n)} =$$



$$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''' = \cos\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

一般地，可得

$$y^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

类似可得

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$



例5 求 $y = \sin kx$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = k \cos kx = k \sin\left(kx + \frac{\pi}{2}\right)$,

$$\begin{aligned}y'' &= (y')' = k^2 \cos\left(kx + \frac{\pi}{2}\right) \\&= k^2 \sin\left(kx + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

$$= k^2 \sin\left(kx + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''' = (y'')' = k^3 \cos\left(kx + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$



$$y' = k \cos kx = k \sin\left(kx + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'' = (y')' = k^2 \sin\left(kx + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''' = (y'')' = k^3 \cos\left(kx + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\hat{y}^{(n)} = k^n \sin\left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

即 $(\sin kx)^{(n)} = k^n \sin\left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$

同理可得 $(\cos kx)^{(n)} = k^n \cos\left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$



• 几个 n 阶导数公式

$$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$$

$$\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(x+a)^{n+1}}$$

$$[\ln(x+a)]^{(n)} = (-1)^{(n-1)} \frac{(n-1)!}{(x+a)^n}$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$



• n 阶导数的线性性质

$$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}; \quad (Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}.$$

例6 设 $y = \frac{1}{x^2 - 1}$, 求 $y^{(5)}$.

解 $\Theta y = \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$

$$\therefore y^{(5)} = \frac{1}{2} \left[\frac{-5!}{(x-1)^6} - \frac{-5!}{(x+1)^6} \right]$$

$$= 60 \left[\frac{1}{(x+1)^6} - \frac{1}{(x-1)^6} \right]$$



思考题1

$$y = \frac{x^{2006}}{x^2 - 1}, \text{求 } y^{(2006)}.$$

解题提示：

$$a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1)$$

$$\frac{x^{2006} - 1}{x^2 - 1} = x^{2004} + x^{2002} + \dots + x^2 + 1$$

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$$



思考题2

设 $g'(x)$ 连续, 且 $f(x) = (x-a)^2 g(x)$, 求 $f''(a)$.

解 $\Theta g(x)$ 可导

$$\therefore f'(x) = 2(x-a)g(x) + (x-a)^2 g'(x)$$

$\Theta g''(x)$ 不一定存在, 故用定义求 $f''(a)$

$$f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a} \quad f'(a) = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} [2g(x) + (x-a)g'(x)] = 2g(a)$$



思考题3

已知 $f^{(n)}(x) = g(x)$, 则 $f^{(n)}(ax+b) = g(ax+b)$,

$$[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b) = a^n g(ax+b).$$

推导: $[f(ax+b)]' = f'(ax+b) \cdot (ax+b)' = af'(ax+b)$,

$$\begin{aligned}[f(ax+b)]'' &= [af'(ax+b)]' \\&= af''(ax+b) \cdot (ax+b)' = a^2 f''(ax+b),\end{aligned}$$

Λ Λ

$$[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b).$$

提示: $f(x) = e^x$, $f^{(n)}(x) = e^x$, 则

$$f^{(n)}(ax) = e^{ax}, \quad [f(ax)]^{(n)} = (e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax},$$

即 $[f(ax)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax)$



思考题3

已知 $f^{(n)}(x) = g(x)$, 则 $f^{(n)}(ax+b) = g(ax+b)$,

$$[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b) = a^n g(ax+b).$$

例如 由 $(e^x)^{(n)} = e^x$,

$$\text{得 } (e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}.$$

$$\text{由 } (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{得 } [\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{由 } (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{得 } [\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$



思考题4

设 $y = \sin^6 x + \cos^6 x$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y = (\sin^2 x)^3 + (\cos^2 x)^3$

$$= (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x)$$
$$= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$$
$$= 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2}$$
$$= \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x$$
$$\therefore y^{(n)} = \frac{3}{8} \cdot 4^n \cdot \cos\left(4x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$



作 业

习题2-4 (P106):

1.单号

6.(2)